


BEK-EN-KLOUSEER



Ken die tekens

Fokus op Beeste

Beeste met bek-en-klouseeer mag blase (vesikels) ontwikkel wat kan vorder tot oop wonde/sere:

- op die pote - tussen die hoewe en by die aansluiting van die hoefhoring en die vel
- in die mond.
- op die tong.
- op die tepels/uier.

Ander tekens van bek- en klouseeer by beeste sluit die volgende in:

- mankheid.
- koors
- depressie
- onwilligheid om te voed
- oormatige speekselafskeiding (kwyl).
- verminderde melkproduksie.
- skielike sterftes by kalwers.

Indien u bek- en-klouseeer by u diere vermoed, rapporteer dit asseblief onmiddellik, deur kontak te maak met:

Die Tuinroete Nooddienste Sentrum

044-805 5071 / 081 709 5193

Dr Leana Janse van Rensburg (Staatsveearts, George),

044 803 3770 / 083 797 0010

leana.jansevanrensburg@westerncape.gov.za

svgeorge@westerncape.gov.za

Dr Cathy Fox (Staatsveearts, Oudtshoorn)

044 203 9443/5 / 082 699 6043

cathy.fox@westerncape.gov.za

doa.svoudtshoorn@westerncape.gov.za



Mondseer waar 'n blase gebars het.



Blasies op tong met geel-ligbruin randte.



Letsel in the hoewe van 'n koei.



Bees se neus met 'n waterige blase binne die neusgat.